

# ASDAN ( 美式 ) 数学竞赛 2017

## 数值估计赛

### 比赛介绍

本轮需要团队在 60 分钟内合作完成 8 道简答题。本轮题目需要选手运用数学技能以及基本常识，尽可能准确的估计出一系列在现实中存在的数值。

### 答题规范 & 评分系统

每个问题的答案都是一个接近命题组正确答案的正整数。对于每道题目，各团队需提交一个正整数，答案需以最简形式（例如：123456789）或科学记数形式（例如： $1.23456789 \times 10^8$ ）提交。

假设该题题号为  $k$ ，命题组给出的答案为  $z_k$ 。如果团队没有作答（答案区域为空白），则该题为 0 分。如果该团队提交的答案为  $x_k$ ，那么该团队本题的得分为

$$S_k = \max \left( 0, 1 - \left| \frac{\log_{10} |x_k/z_k|}{5} \right| \right)$$

得分区间是  $[0, 1]$ 。如果团队估算值与命题组的正确答案最多只差了一个数量级，那么该团队获得较高的分数（至少 0.8 分）。

一个团队在数值估算赛中的总分  $S$  将用于排名，是对该团队每个问题的得分进行累加：

$$S = \sum_{k=1}^8 S_k$$

### 验证

在整场考试中，每个团队最多有 3 次机会，提供某个问题的答案区间，并询问命题组成员正确答案  $z_k$  是否包含在该区间内。（这并不意味着每道题有三次机会，而是整场考试共有三次机会。）

## 数值估计赛例题

以下呈现的题目形式和比赛时的题目类似，同时也可以学习一下解题思路。

- 题目：将人放平，且下一个人的头紧接着上一个人的脚，那么需要多少人可以绕赤道一圈？假设每个人都是一般中国成年男性的身高。
- 答案： $2.33 \times 10^7$  个人。根据 NASA 资料显示，地球一圈大约 40075 km ([https://ssd.jpl.nasa.gov/?planet\\_phys\\_par](https://ssd.jpl.nasa.gov/?planet_phys_par))，并且 2016 年数据显示，中国男性平均身高为 171.8 cm (<https://doi.org/10.7554/eLife.13410.001>)。
- 方法：我们需要估计的值为  $C/H$ ，
  - $H$  代表中国成年男性的平均身高
  - $C$  代表赤道的长度

我们可以分别估计这两个值，最后得出最终值。（以下使用的是英制单位）

根据命题者的经验，一般中国男性的身高，在 5.5 – 6 英尺之间。所以取中间值，我估计  $H$  是 5 英尺 9 英寸（69 英寸）。

地球的周长估计起来有点棘。但其中一个方法是考虑飞机的飞行时间和飞行距离。因此我想出了以下数据：

- 从旧金山飞到芝加哥需要 4 小时。
- 飞机以每小时约 500 英里的速度飞行，一英里内有  $(12\text{英寸}/\text{英尺}) \times (5280\text{英尺}/\text{英里}) = 63360\text{ 英寸}$ 。
- 旧金山和芝加哥有两个小时的时差，全球一共有 24 个时区。（每个时区相差一个小时）

假设每个时区的长度相同，旧金山和芝加哥之间的距离是两个时区，我们对地球的周长  $C$  的估计是

$$(2\text{小时}/\text{时区}) \times (500\text{英里}/\text{小时}) \times (63360\text{英寸}/\text{英里}) \times (24\text{时区}) = 1.52 \times 10^9\text{英寸}$$

因此我们对最终数值的估计是：

$$(1.52 \times 10^9\text{英寸}) \times \left( \frac{1\text{人}}{69\text{英寸}} \right) \approx [2.2 \times 10^7\text{人}]$$

- 得分：我提交的答案得分为：

$$\begin{aligned} \max \left( 0, 1 - \left| \frac{\log_{10} |(2.2 \times 10^7) / (2.33 \times 10^7)|}{5} \right| \right) &= \max \left( 0, 1 - \left| \frac{\log_{10}(0.944206009)}{5} \right| \right) \\ &= 0.995013352 \end{aligned}$$